

ONYPSO®

De mains de maître

Réussir mon traitement avec le
1^{er} traitement **spécifique** du psoriasis de l'ongle

ONYPSO®

Vernis à 15 % d'urée

NOUVEAU

Pour la 1^{ère} fois, un traitement spécifiquement développé pour le psoriasis de l'ongle, ONYPSO®, vient de vous être conseillé. Cette fiche-conseil a été conçue pour vous accompagner dans l'utilisation de ce tout nouveau traitement, et pour vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles, dans les meilleurs délais. Ces conseils sont à suivre pendant toute la durée du traitement (la durée recommandée est habituellement de 6 mois).

Nos conseils :

1. Lavez et séchez bien vos mains et/ou vos pieds avant l'application d'ONYPSO® sur vos ongles.
2. Appliquez ONYPSO® **1 fois par jour** sur les ongles atteints en prenant soin de bien recouvrir toute la surface de l'ongle. La forme vernis est conçue pour une application optimale et facile du produit.
3. L'eau élimine l'urée, préférez donc une application au coucher pour que le produit reste le plus longtemps possible sur l'ongle.
4. Une fois par semaine, nettoyez vos ongles avec un dissolvant pour éliminer la couche filmogène qui pourrait gêner la pénétration de l'urée.



Dispositif médical



Le psoriasis de l'ongle

Conseils utiles

Vous pouvez ainsi compléter le traitement de votre psoriasis des ongles :

- **Respectez les instructions de votre médecin.**
- Faites soigner vos ongles régulièrement et professionnellement.
- Coupez vos ongles court afin de moins les exposer.
- Appliquez des produits de soin émollients sur les cuticules, lorsque celles-ci sont sèches et squameuses.

Evitez en revanche :

- Les faux ongles, qui nuisent de toute manière aux ongles.
- De couper les cuticules, car elles offrent une protection importante pour les ongles.
- Le nettoyage sous les ongles avec des objets pointus ou aiguisés, ce qui risque de décoller encore plus l'ongle du lit de l'ongle ou même de le blesser.
- De réduire l'épaississement (l'hyperkératose) de l'ongle en le limant, ce qui mène à l'effet inverse c'est-à-dire une kératinisation encore plus forte de l'ongle.
- Les traumatismes et surmenages comme lors de parties intensives de football, de dactylographie excessive, de longs bains, l'utilisation des ongles comme outils . . .

Soyez par ailleurs attentifs à d'autres changements de vos ongles et réagissez le plus tôt possible si vous en détectez. Les ongles psoriasiques sont malheureusement plus sujets aux mycoses des ongles.

Tampon

05/2010



Hegenheimermattweg 183 • 4123 Allschwil
061 48 78 900 • www.pierre-fabre.ch

Faire plus pour la dermatologie

Pierre Fabre
DERMATOLOGIE