

# Airol®

---

**PIERRE FABRE**


---

## **OEMéd**

### **Qu'est-ce que Airol et quand est-il utilisé?**

Airol est utilisé sur prescription du médecin et sert au traitement de l'acné et des points noirs. Il normalise la desquamation de la couche cornée et favorise l'élimination des points noirs. Il diminue les signes d'inflammation au niveau des boutons.

Airol participe au processus de renouvellement des cellules de l'épiderme et élimine les boutons sans laisser de cicatrices; il prévient aussi la formation de nouveaux boutons.

Airol peut être associé à des antibiotiques prescrits par votre médecin ou à des mesures diététiques.

### **Quand Airol ne doit-il pas être utilisé?**

Airol ne doit pas être utilisé en cas d'inflammation aiguë de la peau, d'eczéma aigu, de rosacée, de même que lors d'une hypersensibilité au principe actif ou à l'un des composants de la préparation. En outre, les femmes enceintes ou qui prévoient de le devenir ne devraient pas utiliser Airol.

### **Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Airol?**

Airol ne doit entrer en contact ni avec les muqueuses (lèvres, narines) ni avec les yeux. Si tel était cependant le cas, il est recommandé de les rincer abondamment à l'eau.

Pendant la durée du traitement par Airol, vous devez protéger les surfaces traitées contre l'exposition au soleil ou aux radiations UV (lampe à rayons UV, solarium, par exemple) et employer des crèmes solaires à haut facteur de protection. Cela vaut tout particulièrement si votre travail implique une exposition de longue durée au soleil ou si vous présentez une prédisposition accrue à la photosensibilité (sensibilité aux radiations lumineuses). Vous devez attendre la guérison d'un éventuel coup de soleil avant de commencer un traitement par Airol. Vous devez en outre renoncer à employer simultanément d'autres produits pour la peau, en particulier des détergents, des produits à pouvoir desquamant et des lotions tannantes ainsi que d'autres produits contre l'acné ou ne les employer que sur avis médical, étant donné qu'ils peuvent provoquer un dessèchement et une irritation de la peau. Les produits contenant du peroxyde de benzoyl ne doivent pas être utilisés en même temps qu'Airol. D'autres médicaments ne doivent être employés qu'après avis du médecin.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

### **Airol peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Airol ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement. Veillez informer immédiatement votre médecin si vous êtes enceinte ou voulez le devenir.

### **Comment utiliser Airol?**

Votre médecin fixe la dose et la durée du traitement qui conviennent à votre cas. Airol s'applique en général une fois par jour, de préférence le soir, sur les surfaces cutanées atteintes, préalablement nettoyées et bien séchées. Etaler la crème avec les doigts en couche très mince ou appliquer la lotion avec un tampon d'ouate. Se laver soigneusement les mains après l'application.

La durée de traitement est en général de 6 à 14 semaines. Un traitement régulier et constant permet d'obtenir un résultat optimal.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### **Quels effets secondaires Airol peut-il provoquer?**

L'utilisation d'Airol peut provoquer les effets secondaires suivants:

Après avoir appliqué Airol, il se peut que vous ressentiez une sensation de chaleur ou de brûlure. Au cours des premières semaines du traitement, il peut se produire, notamment chez les patients ayant la peau claire, une rougeur de la peau, une sécheresse et des démangeaisons, ou l'on peut même observer une exacerbation apparente de l'acné. Il s'agit là de réactions normales qui confirment l'efficacité du produit et qui disparaissent le plus souvent d'elles-mêmes au bout de quelques jours.

Dans le cas d'une irritation trop forte, veuillez informer votre médecin, qui réduira éventuellement la fréquence d'application (une application tous les deux à trois jours, par exemple).

Airol peut diminuer la pigmentation de la peau pendant le traitement.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **A quoi faut-il encore faire attention?**

Tenir Airol hors de la portée des enfants.

Ne pas avaler!

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Bien refermer le tube ou le flacon après usage.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Après arrêt du traitement, veuillez ramener le médicament restant à votre pharmacien, voire à votre médecin, en vue d'une élimination dans les règles.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

**Que contient Aïrol?**

1 g de crème contient 0,5 mg de trétinoïne comme principe actif, de l'acide benzoïque (agent conservateur; E210), du butylhydroxyanisol (antioxydant; E320), ainsi que d'autres excipients.

1 ml de lotion contient 0,5 mg de trétinoïne comme principe actif, du propylène glycol, ainsi que d'autres excipients.

**Numéro d'autorisation**

38008, 38009 (Swissmedic).

**Où obtenez-vous Aïrol? Quels sont les emballages a disposition sur le marché?**

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Crème: tube de 20 g.

Lotion: flacon de 50 ml.

**Titulaire de l'autorisation**

Pierre Fabre (Suisse) SA, Allschwil.

**Fabricant**

Pierre Fabre Medicaments Production, Ets Progipharm, Rue du Lycée, ZI de Cuiry, 45500 Gien, France.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **janvier 2007** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

---

Ce texte a été approuvé par les autorités et sa publication a été officiellement accordée à la société Documed SA.© Copyright 2008 by Documed SA. Toute utilisation et reproduction sans autorisation est illicite. [10.10.2007]