

CARTE DE RAPPEL PATIENT

Nom du médecin :

Téléphone :

CURAKNE® ne doit en aucun cas être pris pendant la grossesse.

CURAKNE® peut avoir des conséquences graves sur un enfant à naître s'il est pris par une femme enceinte.

Si vous tombez enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte, arrêtez immédiatement la prise de CURAKNE® et contactez votre médecin.

Lisez attentivement la notice avant de commencer le traitement.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la prise de CURAKNE®, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



Ce que vous devez faire s'il y a des possibilités que vous tombiez enceinte :

- **Vous devez impérativement utiliser au moins 1 méthode de contraception hautement efficace (telle qu'un dispositif intra-utérin ou un implant) ou utiliser correctement 2 méthodes de contraception différentes (telles qu'un contraceptif oral et un préservatif) avant le traitement, pendant toute la durée du traitement et pendant 1 mois après l'arrêt du traitement.**
- **Vous ne devez en aucun cas tomber enceinte pendant que vous prenez CURAKNE®, ni au cours du mois suivant l'arrêt du traitement.**
- **Vous devez impérativement aller aux consultations de suivi régulières et faire des tests de grossesse réguliers :**
 - Avant de commencer le traitement, vous ferez un test de grossesse qui devra impérativement être négatif.
 - Pour être sûre de ne pas être enceinte pendant le traitement, vous devrez faire des tests de grossesse régulièrement, idéalement tous les mois. Vous devrez également faire un dernier test de grossesse 5 semaines après l'arrêt du traitement.

Rappel pour les hommes et les femmes

Ce médicament vous a été prescrit personnellement, **ne le partagez avec personne et rapportez toutes les capsules inutilisées à la pharmacie.**