


Votre plan de traitement

lors de la prescription de TOLAK[®] 40 mg/g Crème

Utilisation

Sauf prescription contraire, appliquez TOLAK[®] 1× par jour sur les zones concernées pendant 4 semaines (à partir du _____) :

- 1 Lavez et rincez les zones de peau et séchez-les délicatement en les tamponnant avec une serviette.
- 2 Appliquez une fine couche sur les zones à traiter.
- 3 Faites pénétrer TOLAK[®] dans la peau en massant délicatement et uniformément.
- 4 Lavez-vous soigneusement les mains après avoir utilisé TOLAK[®].



Veillez à vous protéger suffisamment en portant des vêtements adaptés et une crème solaire avec un FPS 50+. Pendant le traitement par TOLAK[®], votre peau est très sensible à la lumière.

Kératose actinique

La kératose actinique (KA) se manifeste sous forme de lésions (zones de couleur sombre ou rougeâtre) sur la peau. Ces «signes avant-coureurs» constituent un stade préliminaire du cancer. En l'absence de traitement, ces lésions se transforment en cancer blanc de la peau (CBP) dans jusqu'à 16% des cas.

La cause principale de la KA est le rayonnement UV. Les lésions cutanées se situent donc généralement sur des zones particulièrement exposées à la lumière du soleil, comme le visage, les oreilles et le cuir chevelu. D'autres facteurs sont la peau claire, l'âge et l'état immunitaire.

Des réactions sur la peau?

Il ne faut pas seulement éliminer les lésions visibles, mais aussi celles qui sont encore cachées sous la peau. C'est pourquoi la peau doit être traitée sur une grande surface, ce qui provoque temporairement des réactions cutanées inflammatoires. TOLAK® provoque également des symptômes tels que des inflammations, des brûlures, des démangeaisons et des érosions.

Ce sont là des réactions normales et nécessaires à la réussite du traitement.

CONSEIL:

Pour atténuer les réactions cutanées, vous pouvez prendre soin des zones irritées en appliquant des émoullients. Les émoullients sont des produits de soin qui contribuent à apaiser la peau.

Recommandation d'utilisation: Appliquez TOLAK® le soir et l'émoullient (produit de soin) le matin. NE conservez PAS TOLAK® au réfrigérateur.



Voici à quoi peuvent ressembler les réactions cutanées habituelles:



Avant le traitement



À la fin du traitement



4 semaines après la fin du traitement