


# Il suo piano terapeutico

per TOLAK<sup>®</sup> 40 mg/g crema

## Impiego

Salvo diversa prescrizione, applicare TOLAK<sup>®</sup> sulle aree interessate 1 volta al giorno per 4 settimane (dal \_\_\_\_\_):

- 1 Lavare e risciacquare le aree di pelle e asciugarle tamponandole delicatamente.
- 2 Applicare uno strato sottile sulle aree da trattare.
- 3 Massaggiare delicatamente e uniformemente TOLAK<sup>®</sup> sulla pelle.
- 4 Lavarsi bene le mani dopo aver applicato TOLAK<sup>®</sup>.



Protegersi sufficientemente con indumenti e creme solari con SPF 50+.  
Durante il trattamento con TOLAK<sup>®</sup> la pelle è molto sensibile alla luce.

## Cheratosi attinica

La cheratosi attinica (AK) si manifesta sotto forma di lesioni (aree scolorite scure o rossastre) sulla pelle. Queste lesioni sono “precursori” del cancro. Se non trattate, in alcuni casi (fino al 16%) si trasformano in un carcinoma a cellule squamose (SCC).

La causa principale della AK sono i raggi UV. I danni alla pelle si manifestano quindi soprattutto nelle zone particolarmente esposte alla luce solare, come il viso, le orecchie e il cuoio capelluto. Altri fattori sono la pelle chiara, l’età e lo stato immunitario.





## Reazioni sulla pelle?

Vanno eliminate non solo le lesioni visibili, ma anche quelle ancora nascoste sotto la pelle. Pertanto, bisogna trattare un'ampia superficie di pelle, e questo porta a reazioni cutanee infiammatorie di natura transitoria. Anche TOLAK® causa sintomi come infiammazione, bruciore, prurito ed erosione.

**Si tratta di reazioni normali, necessarie per il successo del trattamento.**

### SUGGERIMENTO

Per alleviare le reazioni cutanee, è possibile trattare le zone irritate con prodotti emollienti. Gli emollienti sono cosmetici che aiutano a lenire la pelle.

**Raccomandazione per l'uso:** applicare TOLAK® la sera, l'emolliente (cosmetico) al mattino. NON conservare TOLAK® in frigorifero.



*Ecco come possono apparire comunemente le reazioni cutanee:*



*Prima della terapia*



*Al termine della terapia*



*4 settimane dopo la fine della terapia*